SÉRIES NUMÉRIQUES

Exercices d'application

Ex 1 d'Alembert ou pas d'Alembert ?

Etudier la nature des séries suivantes:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \quad \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{\ln n}{n^2}$$

$$\sum_{n \geq 2} 2^{-\ln(\ln n)} \quad \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{t}}{1+t} dt \quad \sum_{n \in \mathbb{N}} e^{-\sqrt{n}}$$

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{n^n}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} \quad (\clubsuit) \sum_{n \geq 2} \frac{(\ln n)^n}{(n^2 + 1)a^n}, a > 0 \quad (\clubsuit) \sum_{n \geq 1} \frac{1! + 2! + \dots + n!}{(n+p)!}$$

$$(\clubsuit) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left[\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{n^\alpha} \quad (\clubsuit) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left[\cos\left(\frac{1}{\ln n}\right)\right]^{\sqrt{n}} \quad (\clubsuit) \sum_{n \geq 3} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$$

Sol. 1):

- $\sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$ **converge**
- $\left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2}$ **converge** (termes positifs à partir d'un certain rang)
- $2^{-\ln(\ln n)} \times n = \exp\left(\ln n \left[1 - \ln 2 \frac{\ln \ln n}{\ln n}\right]\right) \rightarrow +\infty$ donc $\geq \frac{1}{n}$ donc **diverge**
- $\int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{t}}{1+t} dt \leq \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{t} dt = \frac{2}{3} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ donc **converge**
- $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(1 + \frac{1}{n})^{n(n+1)}}{2(n+1)} \rightarrow \frac{e}{2} > 1$ donc **diverge**
- $\frac{(\ln n)^n}{(n^2 + 1)a^n} = \exp[n(\ln n - \ln a) - \ln(n^2 + 1)] \rightarrow +\infty$ **grossièrement divergent**

On peut aussi écrire qu'il existe un rang à partir duquel $\frac{(\ln n)^n}{(n^2 + 1)a^n} \geq \frac{2^n}{(n^2 + 1)}$ et que cette dernière expression est le terme général d'une série divergente.

$$u_n = \left[\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{n^\alpha}$$

$$\cos\left(\frac{1}{n}\right) = 1 - \underbrace{\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)}_{=u} \text{ et } \ln(1+u) = -\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

donc $\ln u_n = \ln\left(\left[\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{n^\alpha}\right) = n^\alpha \ln(1+u) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{n^{\alpha-2}}{2}$, si $\alpha < 2$ alors $u_n \rightarrow 1$

grossière divergence, si $\alpha > 2$, $n^2 u_n \rightarrow 0$ **convergence**, si $\alpha = 2$, $u_n \rightarrow \frac{1}{\sqrt{e}}$

grossière divergence

- $\frac{1! + 2! + \dots + n!}{(n+p)!}$. On montre que $1! + 2! + \dots + n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n!$ donc $\frac{1! + 2! + \dots + n!}{(n+p)!} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(n+1) \dots (n+p)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^p}$.

La série converge si et seulement si $p \geq 2$.

- $u_n = \left[\cos\left(\frac{1}{\ln n}\right)\right]^{\sqrt{n}}$ on a $\ln u_n = \sqrt{n} \ln\left(\cos\left(\frac{1}{\ln n}\right)\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{\sqrt{n}}{2} \frac{1}{(\ln n)^2}$ **converge car** $n^2 u_n \rightarrow 0$.
- $\frac{1}{n \ln n \ln \ln n}$. On compare avec l'intégrale $\int \frac{dt}{t \ln t \ln(\ln t)} = \ln(\ln(\ln n))$ qui **diverge**.

Ex 2 Montrer l'existence et calculer pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cos(nx)}{2^n}$$

Sol. 2): On calcule (somme d'une série géométrique de raison de module strictement plus petit que 1) :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n e^{inx}}{2^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{e^{ix}}{2}\right)^n = \frac{1}{1 + \frac{e^{ix}}{2}} = \frac{2}{2 + e^{ix}} = \frac{4 + 2e^{-ix}}{5 + 4 \cos x}$$

d'où en prenant la partie réelle des deux membres :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cos(nx)}{2^n} = \frac{4 + 2 \cos x}{5 + 4 \cos x}$$

Ex 3 On se donne une série à termes positifs $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ convergente.

Déterminer la nature de $\sum_{n \in \mathbb{N}} \sqrt{a_n a_{2n}}$; $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^2$; $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$.

Sol. 3): $\sqrt{a_n a_{2n}} \leq \frac{1}{2}(a_n + a_{2n})$ donc **convergence**

$a_n^2 \leq a_n$ à partir d'un certain rang car $a_n \rightarrow 0$ donc ≤ 1 donc **convergence**

$\frac{\sqrt{a_n}}{n} \leq \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{n^2} \right)$ donc **convergence**

Ex 4 Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, et $u_0 > 0$. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + \frac{a_n}{u_n}$$

Montrer l'équivalence : (u_n) converge $\Leftrightarrow \left(\sum a_n \right)$ converge.

Sol. 4): Supposons que la suite (u_n) converge, alors il s'agit d'une suite bornée : il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq M$ (il est immédiat que (u_n) est une suite croissante à termes positifs), on a donc pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq a_n \leq M(u_{n+1} - u_n)$ donc $a_n = \underset{n \rightarrow +\infty}{O}(u_{n+1} - u_n)$

or $(u_{n+1} - u_n)$ est le terme général d'une série à termes positifs convergente, donc la série $\left(\sum a_n \right)$ converge.

Supposons que la série $\left(\sum a_n \right)$ converge, comme (u_n) est une suite croissante à termes positifs, on a $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_0$,

et donc $0 \leq u_{n+1} - u_n = \frac{a_n}{u_n} \leq \frac{a_n}{u_0}$, d'où $u_{n+1} - u_n = \underset{n \rightarrow +\infty}{O}(a_n)$

on en déduit avec le théorème de comparaison des séries à termes positifs que $(u_{n+1} - u_n)$ est le terme général d'une série convergente, et donc que la suite (u_n) converge.

Ex 5 Calculer les sommes, si elles existent, des séries:

$$\sum_{n \geq 2} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) ; \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n}{2^n} ; \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{1^2 + \dots + n^2}$$

INDICATION: $\frac{1}{n(n+1)(2n+1)} = \left[\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{4}{2n+1} \right]$

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \text{Arctan} \frac{1}{n^2 + n + 1}$$

INDICATION: on pourra démontrer que $\text{Arctan} \frac{1}{x^2 + x + 1} = \text{Arctan} \frac{1}{x} - \text{Arctan} \frac{1}{x+1}$ pour $x > 0$.

$\sum_{n \in \mathbb{N}} 3^n \sin^3 \left(\frac{x}{3^n} \right)$ INDICATION: on pourra exprimer $\sin(3\theta)$ comme polynôme en $\sin \theta$.

$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^2 + n + 1}{n!}$ INDICATION: on pourra utiliser la base $(1, X, X(X-1))$ de $\mathbb{R}_2[X]$.

Sol. 5): • $\ln(1 - \frac{1}{n^2}) = \ln(\frac{n+1}{n}) - \ln(\frac{n}{n-1})$ donc **converge vers** $\boxed{-\ln 2}$

• $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n}{2^n}$ on montre la convergence aisément puis:

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^{n-1}} = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{n-1}} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n-1}{2^{n-1}} \right) = \frac{1}{2} \left(2 + \sum_{n'=0}^{+\infty} \frac{n'}{2^{n'}} \right)$$

Il vient $S = \frac{1}{2}S + 1$ donc $\boxed{S = 2}$

solution n°2 : on dérive la série géométrique (somme partielle pour les 3/2)

• *Rappel:* $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ donc $\frac{6}{n(n+1)(2n+1)} = 6 \left[\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{4}{2n+1} \right]$

on somme, on utilise la constante d'Euler, il vient: $\boxed{6(3 - 4 \ln 2)}$

(avec $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2k+1} = H_{2n+1} - \frac{1}{2}H_n - 1$, $S_n = 18H_n + 6H_{n+1} - 24H_{2n+1} + 18$)

• pour $x > 0$, $\text{Arctan} a + \text{Arctan} b$?

posons $\tan \alpha = a$ et $\tan \beta = b$ avec α et β dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. On sait que $\tan(\alpha + \beta) =$

$$\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

Donc $\alpha + \beta = \text{Arctan} a + \text{Arctan} b = \text{Arctan} \left(\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \right) + k\pi = \text{Arctan} \left(\frac{a+b}{1-ab} \right) +$

$k\pi$

ici avec $x \geq 1$, $\alpha = \text{Arctan}(\frac{1}{x}) \leq \frac{\pi}{4}$ et $\beta = \text{Arctan} \frac{1}{x+1} < \frac{\pi}{4}$ donc $(0 \leq) \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$ donc $k = 0$.

d'où $\text{Arctan} \frac{1}{x} - \text{Arctan} \frac{1}{x+1} = \text{Arctan} \frac{1/x - 1/(x+1)}{1 + 1/(x(x+1))} = \text{Arctan} \frac{1}{x^2 + x + 1}$

donc $\sum_{n=0}^N \text{Arctan} \frac{1}{n^2 + n + 1} = \text{Arctan} 1 + \text{Arctan} 1 - \text{Arctan} \frac{1}{N+1} \rightarrow \boxed{\frac{\pi}{2}}$

• $\sin(3\theta) = \text{Im}(e^{i3\theta}) = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$ donc $\sin^3 \theta = \frac{1}{4}(3 \sin \theta - \sin(3\theta))$

$$3^n \sin^3\left(\frac{x}{3^n}\right) = \frac{1}{4}(3^{n+1} \sin \frac{x}{3^n} - 3^n \sin(\frac{x}{3^{n-1}})) = \frac{1}{4}(u_{n+1} - u_n) \text{ avec } u_n = 3^n \sin(\frac{x}{3^{n-1}}), n \geq 1$$

$$\text{Donc } \sum_{n=0}^N 3^n \sin^3\left(\frac{x}{3^n}\right) = \frac{1}{4}(u_{N+1} - u_0) \rightarrow \boxed{\frac{1}{4}(3x - \sin 3x)}$$

• $n^2 + n + 1 = n(n-1) + n + 1$ d'où $\frac{n^2 + n + 1}{n!} = \frac{1}{(n-2)!} + \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!}$ pour $n \geq 2$

$$\text{Donc } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 + n + 1}{n!} = 1 + 3 + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(n-2)!} + 2 \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 4 + e + 2(e-1) + (e-2) = \boxed{4e}$$

Ex 6 Étudier la nature des séries suivantes:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\frac{\ln(n+a)}{\ln n} - 1\right)^\alpha, a > 0 \quad \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^\alpha - (\text{Arctann})^\alpha\right), (\alpha \neq 0)$$

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \sin(\pi(2 + \sqrt{3})^n) \text{ (utiliser : } (2 - \sqrt{3})^n \text{)}$$

Sol. 6):

- $\left(\frac{\ln(n+a)}{\ln n} - 1\right)^\alpha = \left(\frac{\ln(n+\frac{a}{n})}{\ln n}\right)^\alpha \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \left(\frac{a}{n \ln n}\right)^\alpha$ **converge ssi** $\alpha > 1$
- $\left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^\alpha - (\text{Arctann})^\alpha\right) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^\alpha \left(1 - \left(\frac{2}{\pi} \text{Arctann}\right)^\alpha\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \left(\frac{\pi}{2}\right)^\alpha \alpha \left(1 - \frac{2}{\pi} \text{Arctann}\right)$

car $1 - x^\alpha \underset{x \rightarrow 1}{\sim} -\alpha(x-1)$

d'où

$$\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \alpha \left(\frac{\pi}{2}\right)^{\alpha-1} \left(\frac{\pi}{2} - \text{Arctann}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \alpha \left(\frac{\pi}{2}\right)^{\alpha-1} \left(\text{Arctan} \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \alpha \left(\frac{\pi}{2}\right)^{\alpha-1} \frac{1}{n}$$

donc **diverge**.

- $\sum_{n \in \mathbb{N}} \sin(\pi(2 + \sqrt{3})^n)$ (utiliser : $(2 - \sqrt{3})^n$.)

$$\text{On a } (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} [1 + (-1)^k] \sqrt{3}^k,$$

or si k est impair le terme correspondant est nul, et si k est pair, le terme correspondant est un entier pair,

d'où $(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n = 2N$ où $N \in \mathbb{N}$. On en déduit :

$$u_n = \sin \left[\pi (2 + \sqrt{3})^n \right] = \sin \left[2N\pi - \pi (2 - \sqrt{3})^n \right] = -\sin \left[\pi (2 - \sqrt{3})^n \right] \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\pi (2 - \sqrt{3})^n,$$

puisque $2 - \sqrt{3} < 1$, or $(2 - \sqrt{3})^n$ est le terme général d'une série géométrique convergente, donc la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge.

Ex 7 Montrer que la série de terme général $u_n = (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)}, n \geq 1$, est convergente puis calculer sa somme.

INDICATION on pourra calculer $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}$.

Sol. 7): On montre que

$$(-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)} = 2 \frac{(-1)^{n-1}}{n} + \underset{n \rightarrow +\infty}{O} \left(\frac{1}{n^2}\right).$$

D'après le critère spécial des séries alternées, ou parce que l'on connaît la série harmonique alternée, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ converge, par ailleurs la série $\sum_{n \geq 1} \underset{n \rightarrow +\infty}{O} \left(\frac{1}{n^2}\right)$ est **absolument** convergente donc la série converge.

CALCUL DE LA SOMME

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N u_n &= \sum_{n=1}^N (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) \\ &= \sum_{n=1}^N (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \sum_{n=2}^{N+1} (-1)^n \frac{1}{n} \\ &= 1 + \sum_{n=2}^N ((-1)^{n-1} + (-1)^n) \frac{1}{n} + (-1)^{N+1} \frac{1}{N+1} \\ &= 1 + (-1)^{N+1} \frac{1}{N+1} \underset{N \rightarrow +\infty}{\rightarrow} 1. \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)} = 1.}$

Ex 8 Séries de Bertrand

Etudier la série de terme général $u_n = \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) en comparant à une série de Riemann lorsque $\alpha \neq 1$ et à une intégrale lorsque $\alpha = 1$.

APPLICATION : étudier les séries de terme généraux $v_n = \frac{1}{\ln n!}$ puis $w_n = n^{\frac{\ln n}{n}} - 1$.

Sol. 8): $\boxed{\alpha = 1}$ La fonction définie sur $[2, +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\beta}$, est une fonction décroissante positive (inutile de dériver). On obtient facilement une primitive F de f :

$$F(x) = \frac{(\ln x)^{1-\beta}}{1-\beta} \text{ si } \beta \neq 1 \quad \text{et} \quad F(x) = \ln(\ln x) \text{ si } \beta = 1.$$

Donc on constate que F possède une limite finie en $+\infty$ si et seulement si $\beta > 1$, et le critère de comparaison à une intégrale (évoqué en cours, qu'il faut savoir redémontrer) montre que la série de terme général $1/(n(\ln n)^\beta)$ converge si et seulement si $\beta > 1$.

$\boxed{\alpha < 1}$ Si $n \geq 2$, on écrit $\frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} = \frac{1}{n} \frac{n^{1-\alpha}}{(\ln n)^\beta}$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{1-\alpha}/(\ln n)^\beta = +\infty$.

Donc, pour n assez grand $\frac{n^{1-\alpha}}{(\ln n)^\beta} \geq 1$, et $\frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} \geq \frac{1}{n}$. La série diverge par comparaison à la série harmonique.

$\boxed{\alpha > 1}$ Soit α' tel que $\alpha > \alpha' > 1$. Si $n \geq 2$, on écrit

$$\frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} = \frac{1}{n^{\alpha'}} \frac{1}{n^{\alpha-\alpha'} (\ln n)^\beta}.$$

Mais $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha-\alpha'} (\ln n)^\beta = +\infty$. Donc, pour n assez grand $\frac{1}{n^{\alpha-\alpha'} (\ln n)^\beta} \leq 1$, et

$$\frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} \leq \frac{1}{n^{\alpha'}}.$$

La série converge par comparaison à une série de Riemann.

Remarque : ces résultats sont utilisés dans beaucoup d'exercices d'oraux. Il est conseillé de savoir les redémontrer.

Application : En majorant chaque terme du produit $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$ par n , on a, pour $n \geq 1$, l'inégalité $n! \leq n^n$, et donc $\ln n! \leq n \ln n$.

Finalement $v_n \geq \frac{1}{n \ln n}$. Comme la série de terme général $1/(n \ln n)$ est une série de Bertrand divergente ($\alpha = \beta = 1$), il en résulte que la série de terme général v_n diverge.

La suite $((\ln n)^2/n)$ converge vers 0. Comme on a l'équivalent $e^u - 1 \underset{u \rightarrow 0}{\sim} u$, on a donc

$w_n = e^{(\ln n)^2/n} - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{(\ln n)^2}{n}$. On obtient une série de Bertrand divergente ($\alpha = 1, \beta = -2$), il en résulte que la série de terme général w_n diverge.

Ex 9 Un théorème sur les suites récurrentes: le théorème du point fixe

Soit $k \in [0, 1[$ et $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant

$$\forall (x, y) \in \mathbb{C}^2 \quad |f(x) - f(y)| \leq k|x - y| \text{ (application contractante)}$$

- 1) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet au plus une solution.
- 2) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in \mathbb{K}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Vérifier que $|u_{n+1} - u_n| \leq k^n |u_1 - u_0|$.
- 3) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge (étudier la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} (u_{n+1} - u_n)$).
- 4) Déterminer sa limite.

Sol. 9): pour le c): $\sum_{n \in \mathbb{N}} (u_{n+1} - u_n)$ est absolument convergente donc convergente.

Il y a bien sûr convergence vers l'unique point fixe.

Ex 10 X 2017 RMS Soit (a_n) une suite réelle. On suppose que $a_n \sim \alpha \ln n$ lorsque $n \rightarrow +\infty$ avec $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$.

- a) Montrer que la série de terme général e^{-a_n} converge si $\alpha > 1$ et diverge si $\alpha < 1$.
- b) Peut-on conclure si $\alpha = 1$?

Sol. 10):

- 1) Supposons $\alpha > 1$. Soit α' tel que $1 < \alpha' < \alpha$. On a pour n assez grand, $\frac{a_n}{\ln n} > \alpha'$

donc $e^{-a_n} < e^{-\alpha' \ln n} = \frac{1}{n^{\alpha'}}$ t.g. d'une série convergente.

Supposons $\alpha < 1$. On fait de même avec $\alpha' \in]\alpha, 1[$.

On a pour n assez grand, $e^{-a_n} > e^{-\alpha' \ln n} = \frac{1}{n^{\alpha'}}$ t.g. d'une série divergente.

- 2) Cas douteux comme pour d'Alembert.

$a_n = \ln n$ donne $e^{-a_n} = \frac{1}{n}$ t.g. d'une série divergente.

$a_n = \ln n + 2 \ln \ln n$ donne $e^{-a_n} = \frac{1}{n(\ln n)^2}$ t.g. d'une série convergente.

Exercices d'entraînement

Ex 11 ☛ Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \begin{cases} 1/n & \text{si } n \text{ est un carré} \\ 1/n^2 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Convergence et somme de la série $\sum u_n$.

Sol. 11): On écrit que $\sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \frac{1}{k^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \frac{1}{k^4} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^4}$.

Pour information, $\sum_{k=1}^{+\infty} u_k = 2 \times \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^4}{90}$.

Ex 12 ☛

1) Montrer par récurrence que pour $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

2) À l'aide du produit de Cauchy, établir l'égalité

$$e \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)}{n!}.$$

Sol. 12):

1) On procède comme demandé par récurrence.

Pour $n = 1$, c'est évident.

Puis pour $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} \frac{(-1)^{k-1}}{k} &= \frac{(-1)^n}{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) \frac{(-1)^{k-1}}{k} \\ &= \frac{(-1)^n}{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^{k-1}}{k} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \\ &= \frac{(-1)^n}{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^{k-1}}{k} + \frac{1 + (-1)^{n+1}}{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \frac{1}{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \end{aligned}$$

car

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} &= \sum_{k=1}^n \frac{n!}{k!(n-(k-1))!} (-1)^{k-1} \\ &= \frac{-1}{n+1} \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} (-1)^k \\ &= \frac{-1}{n+1} \left((1-1)^{n+1} - 1 - (-1)^{n+1} \right) \\ &= \frac{1 + (-1)^{n+1}}{n+1} \end{aligned}$$

2) La série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot n!}$ est absolument convergente.

Écrivons

$$\begin{aligned} e \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot n!} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot n!} \\ &\stackrel{\text{produit de Cauchy}}{=} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{(n-k)!} \times \frac{(-1)^{k-1}}{k \cdot k!} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right). \end{aligned}$$

Ex 13 Déterminer la nature de $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{j^n}{n}$ avec $j = e^{2i\pi/3}$.

INDICATION: regrouper par paquets de 3 termes...

Sol. 13): on regroupe par paquets de 3, sachant que le terme général tend vers 0.

$\frac{1}{3p} + \frac{j}{3p+1} + \frac{j^2}{3p+2} = \frac{(6+3j)p+2}{3p(3p+1)(3p+2)} \sim \frac{2+j}{9p^2}$ donc (abs) **convergence**
 puis on passe de la suite extraite (S_{3p+2}) à la suite (S_n) ...

Ex 14 ☛ Pour $n \geq 1$, on pose $u_n = \ln n/n$ et $v_n = (-1)^n u_n$.

1) Préciser la nature des séries de termes généraux u_n et v_n .

On pose $S_n = \sum_{p=1}^n u_p$ et $T_n = \sum_{p=1}^n v_p$.

2) Donner un équivalent de S_n à l'infini.

3) Montrer que $S_{2n} - S_n = \ln 2 \cdot \ln n + \frac{(\ln 2)^2}{2} + o_{n \rightarrow +\infty}(1)$.

4) Calculer $S_{2n} + T_{2n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

5) En déduire $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$.

Sol. 14): 1) Pour $n \geq 2$, on a $u_n \geq \frac{\ln 2}{n}$ et la série de terme général u_n diverge par comparaison à la série harmonique.

Soit f la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par $f(x) = \ln x/x$. Cette fonction est dérivable et, si $x \geq e$, on a $f'(x) \leq 0$, donc f est décroissante sur $[e, +\infty[$. La suite $(\ln n/n)$ décroît à partir du rang 3 et converge vers 0. Il résulte du critère de Leibniz qu'elle converge.

2) Puisque la fonction f est décroissante et tend vers 0 à l'infini, la série de terme général $\int_{n-1}^n f(t)$ et la série de terme général $f(n)$ sont de même nature, donc divergentes. De plus, d'après le cours, on a

$$S_n = \int_1^n f(x)dx + \ell + o_{n \rightarrow +\infty}(1) = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^n = \frac{(\ln n)^2}{2} + \ell + o_{n \rightarrow +\infty}(1) \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln n)^2}{2}.$$

3) On a

$$S_{2n} - S_n = \left(\frac{(\ln 2n)^2}{2} + \ell + o_{n \rightarrow +\infty}(1) \right) - \left(\frac{(\ln n)^2}{2} + \ell + o_{n \rightarrow +\infty}(1) \right) = \ln 2 \cdot \ln n + \frac{(\ln 2)^2}{2} + o_{n \rightarrow +\infty}(1)$$

4) On a

$$S_{2n} + T_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} (1 + (-1)^k)u_k = 2 \sum_{p=1}^n u_{2p} = \sum_{p=1}^n \frac{\ln(2p)}{p} = \sum_{p=1}^n \frac{\ln p}{p} + \sum_{p=1}^n \frac{\ln 2}{p}.$$

On obtient donc $S_{2n} + T_{2n} = S_n + \ln 2 \sum_{p=1}^n \frac{1}{p}$.

5) Si γ est la constante d'Euler, on a $\sum_{p=1}^n \frac{1}{p} = \ln n + \gamma + o(1)$, et donc

$$T_{2n} = S_n - S_{2n} + (\ln n + \gamma) \ln 2 + o(1) = -\frac{(\ln 2)^2}{2} + \gamma \ln 2 + o(1),$$

et, puisque la suite (T_n) converge, on en déduit $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} T_{2n} = \boxed{-\frac{(\ln 2)^2}{2} + \gamma \ln 2}$

Ex 15 ☛ Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite décroissante d'éléments de $\mathbb{R}^+$ de limite 0. Pour $n \geq 1$, on pose $v_n = n^2 u_{n^2}$. Y a-t-il un lien entre la convergence des séries de termes généraux u_n et v_n ?

Sol. 15): Testons tout d'abord avec des séries de Riemann. Si $u_n = 1/n^\alpha$, on a $v_n = 1/n^{2(\alpha-1)}$. La série de terme général u_n converge si et seulement si $\alpha > 1$, alors que la série de terme général v_n converge si et seulement si $2(\alpha-1) > 1$, c'est-à-dire $\alpha > 3/2$. Les deux séries ne sont pas toujours de même nature. Mais on constate que si la série de terme général u_n diverge, il en est de même de la série de terme général v_n . En fait ce résultat est général. En voici la démonstration.

Tout d'abord, comme la suite (u_n) est décroissante, on peut minorer par u_{n^2} les termes u_p lorsque $n^2 + 1 \leq p \leq (n+1)^2$ et l'on obtient

$$\sum_{p=n^2+1}^{(n+1)^2} u_p \leq u_{n^2} \sum_{p=n^2+1}^{(n+1)^2} 1 = (2n+1)u_{n^2},$$

Mais $n^2 - 2n - 1$ est positif dès que $n \geq 3$, donc, dans ces conditions on obtient l'inégalité $\sum_{p=n^2+1}^{(n+1)^2} u_p \leq n^2 u_{n^2}$. Alors $\sum_{n=3}^N \left(\sum_{p=n^2+1}^{(n+1)^2} u_p \right) \leq \sum_{n=3}^N n^2 u_{n^2}$, c'est-à-dire $\sum_{n=10}^{(N+1)^2} u_n \leq \sum_{n=3}^N n^2 u_{n^2}$. Si la série de terme général u_n diverge, la suite $\left(\sum_{n=10}^{(N+1)^2} u_n \right)$ admet $+\infty$ comme limite. Il en résulte que la suite $\left(\sum_{n=3}^N n^2 u_{n^2} \right)$ admet également $+\infty$ comme limite et donc que la série de terme général (v_n) diverge.

Ex 16 🐛 Etudier si la série de terme général $u_n = e^{(-1)^n/\sqrt{n}} - 1$ converge.

Sol. 16): Puisque la suite $((-1)^n/\sqrt{n})$ converge vers 0, on peut utiliser le développement limité au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto e^x$. On a donc $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

La série de terme général $(-1)^n/\sqrt{n}$ converge d'après le critère de Leibniz. D'autre part $\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n}$, et la série de terme général $\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ diverge par comparaison à la série harmonique. Il en résulte que la série de terme général u_n diverge, et ceci bien que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} (-1)^n/\sqrt{n}$.

On a donc l'exemple de deux séries dont les termes généraux sont équivalents mais qui ne sont pas de même nature.

Ex 17 🐛

On veut étudier la nature de la série de terme général $u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^a}\right)$, où $a > 0$.

- 1) Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n = (-1)^n/n^a$, et en déduire pour quelles valeurs de a la série converge absolument.
- 2) En utilisant un développement limité à l'ordre 2 en 0 de la fonction $u \mapsto \ln(1 + u)$ trouver un équivalent de $u_n - v_n$ et en déduire pour quelles valeurs de a la série converge.

Sol. 17): 1) La suite $((-1)^n/n^a)$ converge vers 0. On peut donc utiliser le fait que, en 0, $\ln(1 + u) \underset{u \rightarrow 0}{\sim} u$, et l'on obtient $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{(-1)^n}{n^a}$, donc $|u_n| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^a}$.

On trouve une série de Riemann qui converge si et seulement si $a > 1$. Donc la série de terme général u_n converge absolument si et seulement si $a > 1$.

2) En utilisant le développement limité en 0 : $\ln(1 + u) = u - u^2/2 + o(u^2)$, on obtient $u_n = \frac{(-1)^n}{n^a} - \frac{1}{2n^{2a}} + o\left(\frac{1}{n^{2a}}\right)$. On a donc $u_n = v_n + w_n$, où $v_n = \frac{(-1)^n}{n^a}$ et $w_n = -\frac{1}{2n^{2a}} + o\left(\frac{1}{2n^{2a}}\right)$. La série de terme général v_n converge d'après le critère de Leibniz, puisque la suite $(1/n^a)_{n \geq 1}$ est décroissante et converge vers 0.

Pour la série de terme général $w_n = u_n - v_n$, on a $w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^{2a}}$. C'est donc une série de Riemann de signe constant qui converge si et seulement si $2a > 1$, soit $a > 1/2$.

Donc, si $1/2 < a \leq 1$, la série de terme général u_n est la somme de deux séries convergentes. Elle converge donc. Par contre si $0 < a \leq 1/2$, la série de terme général u_n est la somme d'une série convergente et d'une série divergente. Elle diverge donc.

En résumé :

- si $a > 1$ la série converge absolument
- si $1/2 < a \leq 1$ la série est semi-convergente
- si $0 < a \leq 1/2$ la série diverge.

Ex 18 MINES 2011 Soit, pour $n \geq 2$: $u_n = \prod_{k=2}^n (2 - 3^{1/k})$.

- 1) Étudier la suite de terme général u_n .
- 2) Nature de la série de terme général u_n ?

Sol. 18):

1) On a $\ln(u_n) = \sum_{k=2}^n \ln(2 - 3^{1/k})$

Or $\ln(2 - 3^{1/k}) = -\ln(3)/k + \mathcal{O}(1/k^2)$.

Ainsi, avec le D.A. de la série harmonique, $\ln(u_n) = -\ln(3) \ln(n) + s_n$, où $(s_n)_n$ est une suite convergente.

Donc $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{K}{n^3}$ avec $K > 0$.

2) $\sum u_n$ converge.

Réf. RMS PC Mines 2011 exo 180

Ex 19 MINES 2011 Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par $u_0 \in]0, 1[$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + u_n^2)$.

- 1) Déterminer le comportement de u_n quand $n \rightarrow +\infty$?
- 2) Déterminer la nature de la série de terme général u_n .
- 3) Donner un équivalent de u_n quand $n \rightarrow +\infty$.

Sol. 19):

- 1) Soit $f(x) = \frac{1}{2}(x + x^2)$. L'intervalle $[0, 1]$ est stable et $f(x) \leq x$ donc la suite est décroissante, bornée et converge le seul point fixe 0.
- 2) On a $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$ donc par d'Alembert, la série converge.
- 3) $\ln(u_{n+1}) = \ln(u_n) + \ln(1 + u_n) - \ln(2)$. Par comparaison, la série $\sum \ln(1 + u_n)$ converge, donc $\ln(u_n) = s_n - n \ln(2)$, où $(s_n)_n$ est une suite convergente.
Ainsi, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{K}{2^n}$ avec $K > 0$.

Réf. RMS PC Mines 2011 exo 183

Ex 20 X 2014 Trouver un équivalent de $u_n = 1! + 2! + \dots + n!$.

Sol. 20): Il suffit de majorer (grossièrement) u_{n-2} par $(n-1)(n-2)!$. Alors

$$\begin{aligned} n! &\leq u_n \leq u_{n-2} + (n-1)! + n! = (n-1)(n-2)! + (n-1)! + n! \\ &= 2(n-1)! + n! = n! \left(1 + \frac{2}{n}\right). \end{aligned}$$

L'équivalent est donc $n!$.

Réf. RMS PC 2014 X exo 83

Ex 21 MINES 2012 Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^{+*})$ telle que $f'(x)/f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$. Déterminer la nature de la série de terme général $f(n)$.

Sol. 21): • Supposons $\ell \neq 0$.

$(\ln(f))'(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ell$ donc $\ln f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ell \cdot x$.

Si $\ell > 0$ alors $f(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc divergence grossière.

Si $\ell < 0$, fixons un $\ell' \in]\ell, 0[$.

Il existe $x_0 \geq 0$ tel que pour $x \geq x_0$, $\frac{\ln f(x)}{x} \leq \ell'$ donc $f'(x) \leq e^{\ell'x}$.

Il vient pour n assez grand, $0 \leq f(n) \leq q^n$ avec $q = e^{\ell'} < 1$ donc la série converge.

• Examinons le cas $\ell = 0$.

Tout peut se passer.

Par exemple, $f(x) = \frac{1}{x+1}$, on a bien $\frac{f'(x)}{f(x)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et la série diverge.

$f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$, on a bien $\frac{f'(x)}{f(x)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et la série converge.

Solution n°2 pour $\ell < 0$.

Par hypothèse, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un réel $A > 0$ tel que pour tout réel $x \geq A$,

$$\ell - \varepsilon \leq \frac{f'(x)}{f(x)} \leq \ell + \varepsilon$$

d'où, si n est un entier supérieur à A ,

$$\ell - \varepsilon \leq \int_n^{n+1} \frac{f'(x)}{f(x)} dx \leq \ell + \varepsilon \Rightarrow \ell - \varepsilon \leq \ln \left(\frac{f(n+1)}{f(n)} \right) \leq \ell + \varepsilon.$$

CONCLUSION $\ln \left(\frac{f(n+1)}{f(n)} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ donc $\frac{f(n+1)}{f(n)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} e^\ell < 1$ et la règle de d'Alembert permet de conclure que la série de terme général $f(n)$ converge.

Réf. RMS12 Mines exo 190

Ex 22 X 2014

Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite décroissante de réels > 0 . On suppose que $n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \rightarrow \ell$.

- 1) Montrer que si $\ell > 1$ alors la série de terme général a_n converge.
- 2) Montrer que si $\ell < 1$ alors la série de terme général a_n diverge.

Sol. 22): Si $n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - \ell = \varepsilon_n$ tend vers 0, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{1 + \ell/n + \varepsilon_n/n} = 1 - \frac{\ell}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

À partir de là, c'est vu en cours (Raabe-Duhamel)

Réf. RMS PC 2014 X exo 94

Exercices d'approfondissement

Ex 23 ✎

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $0 \leq e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{n.n!}$.

2) Étudier la convergence de la série $(\sum u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = \sin(n!\pi e)$

Sol. 23): a) On sait que $0 < e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!}$. Or on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+3}^{+\infty} \frac{(n+2)!}{(n+3)!} &= \frac{1}{n+3} + \frac{1}{(n+3)(n+4)} + \frac{1}{(n+3)(n+4)(n+5)} + \dots \\ &\leq \frac{1}{n+3} + \sum_{k=n+3}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} \end{aligned}$$

$$\sum_{k=n+3}^{+\infty} \frac{(n+2)!}{(n+3)!} \leq \frac{1}{n+3} + \sum_{k=n+3}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{2}{n+3} \leq \frac{2}{n}$$

(avec un effet dominos).
D'où on déduit

$$\begin{aligned} 0 < e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = \frac{1}{n!} \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \left(1 + \sum_{k=n+3}^{+\infty} \frac{(n+2)!}{(n+3)!} \right) \right] \\ &\leq \frac{1}{n!} \left[1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \left(1 + \frac{2}{n} \right) \right] = \frac{1}{n!} \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)n} \right] = \frac{1}{n.n!} \end{aligned}$$

b) On en déduit

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!} &\leq e \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!} + \frac{1}{n.n!} \\ \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k!} + \frac{1}{n} &\leq (n-1)!e \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k!} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

et donc $(n-1)!e = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k!} + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Or $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k!} = (n-1)! + \dots + (n-2)(n-1) + (n-1) + 1$ est un entier K_n de même parité que n , on en déduit :

$$u_{n-1} = \sin((n-1)\pi e) = \sin \left[K_n \pi + \frac{\pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] = (-1)^n \sin \left[\frac{\pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right]$$

On en déduit avec le développement limité de sinus en 0 : $u_{n-1} = \frac{(-1)^n \pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
Cette série est donc la somme de deux séries convergentes : elle est convergente.

Ex 24 ✎ Déterminer la nature de la série $\sum_n \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha} + \frac{1}{n^{2\alpha}} \right)$ suivant les valeurs de $\alpha > 0$.

Sol. 24): On fait un développement asymptotique en utilisant

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o_{x \rightarrow 0}(x^4).$$

On trouve après calcul, $u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} - \frac{(-1)^3}{n^{3\alpha}} + \frac{1}{8} \frac{1}{n^{4\alpha}} + \underbrace{o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^{4\alpha}} \right)}_{\sim \frac{1}{8n^{4\alpha}}}$.

Le début converge par CSSA donc $\sum_n u_n$ converge ssi $4\alpha > 1 \Leftrightarrow \alpha > \frac{1}{4}$.

Ex 25 ✎ MINES 2011 Soient, pour $n \geq 2$, $u_n = \frac{\sin(\ln n)}{n}$ et $v_n = \int_n^{n+1} \frac{\sin(\ln x)}{x} dx$.

- 1) Montrer que les séries de termes généraux u_n et v_n sont de même nature.
- 2) Quelle est la nature de ces séries ?

Sol. 25): 1) Restons simples ! Si $x \in [n, n+1]$,

$$\frac{\sin(\ln(n))}{n} - \frac{\sin(\ln(x))}{x} = \frac{\sin(\ln(n))}{n} - \frac{\sin(\ln(x))}{n} + \frac{\sin(\ln(x))}{n} - \frac{\sin(\ln(x))}{x} = A + B.$$

Ensuite, $0 \leq \ln(x) - \ln(n) = \ln\left(1 + \frac{x-n}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$.

Comme $|\sin(u) - \sin(v)| \leq |u - v|$, $A \leq 1/n^2$.

Pour l'autre terme, on majore la valeur absolue du sinus par 1, et c'est facile.

2) Changement de variable $\ln(x) = u$. La somme partielle de la série des intégrales est, après le changement de variable indiqué, et à une constante additive près, $s_n = \cos(\ln n)$.

Il faut montrer que la suite $(\cos(\ln n))_n$ diverge.

Démonstration de $(\cos(\ln n))_n$ diverge (par l'absurde).

démo n°1

Supposons que la suite converge vers ℓ .

$$\cos(\ln(2^n)) = \cos(n \ln 2) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell.$$

Lemme $(\cos(n\theta))$ converge (vers a) ssi $\theta = 0 \pmod{\pi}$.

(car $\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2\cos(n\theta)\cos(\theta)$ donc si $a \neq 0$, $\cos \theta = 1$, gagné, si $a = 0$ alors

$\cos((n+1)\theta) - \cos((n-1)\theta) = -2\sin(n\theta)\sin(\theta)$ donc si $\sin \theta \neq 0$, $\sin n\theta \rightarrow 0$ absurde car $\cos^2 n\theta + \sin^2 n\theta = 1 \rightarrow 0$).

Donc $\ln 2 = 0 \pmod{\pi}$ or $\ln 2 \in]0, \pi[$, absurde.

démo n°2 pour réviser Tchebychev.

Supposons que la suite $(\cos(\ln n))_n$ converge vers ℓ . Alors, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\cos(\ln(n^k)) = \cos(k \ln n) = T_k(\cos(\ln n))$ (où T_k est le k -ième polynôme de Tchebychev) converge aussi vers ℓ . Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\ell = T_k(\ell)$. En particulier, $\ell = T_2(\ell) = 2\ell^2 - 1$. Mais aussi, $\ell = T_3(\ell) = 4\ell^3 - 3\ell$. Ces deux équations ont comme unique racine commune $\ell = 1$. Par ailleurs, $\cos(\ln(2n)) = \cos(\ln 2 + \ln n)$ converge aussi vers $\ell = 1$. Or

$$\cos(\ln 2 + \ln n) = \cos(\ln 2)\cos(\ln n) - \sin(\ln 2)\sin(\ln n),$$

qui tend vers 1, alors que $\cos(\ln n)$ tend vers 1, et donc $\sin(\ln n)$ tend vers 0. En passant à la limite, cela entraînerait que $\ln 2 = 1$, ce qui est faux.

Réf. RMS PC Mines 2011 exo 182

Ex 26 MINES 2018 A. Bakkoury Déterminer la nature de

$$\sum_{n \geq 1} \left(2 - \exp\left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}\right) \right).$$

Sol. 26):

$$\text{On a } \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \sum_{k=1}^n \int_0^1 (-t)^{k-1} dt = \int_0^1 \frac{1 - (-t)^n}{1+t} dt = \ln 2 - \int_0^1 \frac{(-t)^n}{1+t} dt.$$

$$\text{Donc } \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln 2 - R_n \text{ avec } R_n = \int_0^1 \frac{(-t)^n}{1+t} dt.$$

Remarquons que $|R_n| = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} dt \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1} = o\left(\frac{1}{n}\right)$ et que $(|R_n|)_{n \geq 1}$ est décroissante.

Il vient

$$\begin{aligned} \exp\left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}\right) &= \exp(\ln 2 - R_n) = 2 \times \exp(-R_n) \\ &= 2 \left(1 - R_n + o_{n \rightarrow +\infty}(R_n^2)\right) \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} 2 - \exp\left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}\right) &= R_n + o_{n \rightarrow +\infty}(R_n^2) \\ &= (-1)^n |R_n| + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Comme $\sum_{n \geq 1} (-1)^n |R_n|$ vérifie le CSSA et $\sum_{n \geq 1} o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ est absolument convergente.

En conclusion, la série converge.

Ex 27 MINES 2014 Soit $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On suppose que, pour toute suite $(b_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telle que la série de terme général $|b_n|^2$ soit convergente, la série de terme général $a_n b_n$ est convergente. Montrer que la série de terme général $|a_n|^2$ est convergente.

Sol. 27): Supposons que $\sum_n |a_n|^2$ diverge. Nous allons construire une suite (b_n) de carré

(de module) sommable, mais telle que la série $\sum a_n b_n$ diverge et même, à partir d'un certain rang, soit réelle positive tendant vers $+\infty$.

Premier cas. si $(a_n)_n$ ne tend pas vers 0, il existe $\varepsilon > 0$ et une sous-suite $(a_{\varphi(p)})_p$ telle que $\forall p \geq 1$, $|a_{\varphi(p)}| \geq \varepsilon$, où, rappelons-le, la suite $(\varphi(p))_p$ est strictement croissante.

Pour chaque $p \geq 1$, posons $\theta_p = \arg(a_{\varphi(p)})$, puis $b_{\varphi(p)} = \frac{e^{-i\theta_p}}{p}$, et si n n'est pas l'un des $\varphi(p)$, $b_n = 0$.

Alors

$$\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^2 = \sum_{p=1}^{\infty} |b_{\varphi(p)}|^2 = \sum_{p=1}^{\infty} 1/p^2 < \infty.$$

Mais $b_{\varphi(p)} a_{\varphi(p)}$ est un réel $\geq \frac{\varepsilon}{p}$, terme général d'une série à termes positifs divergente.

Deuxième cas. a_n tend vers 0 quand n tend vers l'infini.

Soit N un indice tel que, pour tout $n \geq N$, $|a_n|^2 \leq 1$.

On construit une suite $(\varphi(p))_p$ est strictement croissante telle qu'en découpant la série

$\sum_{n \geq N} |a_n|^2$ en tranches, la p -ième allant de l'indice $\varphi(p-1) + 1$ à l'indice $\varphi(p)$, on ait pour

$$\text{tout } p, 1 \leq \sum_{k=\varphi(p-1)+1}^{\varphi(p)} |a_k|^2 \leq 2.$$

Pour tout k dans cette tranche, on pose $b_k = \frac{\overline{a_k}}{p}$. On voit que $\sum_{k=\varphi(p-1)+1}^{\varphi(p)} |b_k|^2 \leq \sum_{k=\varphi(p-1)+1}^{\varphi(p)} \frac{|a_k|^2}{p^2}$

$\frac{2}{p^2}$, terme général d'une série convergente.

Or $\sum_{k=\varphi(p-1)+1}^{\varphi(p)} a_k b_k = \sum_{k=\varphi(p-1)+1}^{\varphi(p)} \frac{|a_k|^2}{p}$, terme général d'une série à termes positifs divergente.

Réf. RMS PC 2014 Mines exo 174

Ex 28 X 2015 RMS Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ injective. Nature de la série de terme général $f(n)/n^2$?

Sol. 28): Posons $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ avec $u_k = \frac{f(k)}{k^2}$.

On a $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{4n^2} \sum_{k=n+1}^{2n} f(k) \geq \frac{1}{4n^2} \sum_{k=1}^n k \geq \frac{1}{8}$ donc (S_n) ne converge pas.

Ex 29 X 2015 RMS Existe-t-il $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que la série de terme général u_n converge et la série de terme général u_n^3 diverge ?

Sol. 29): Pas simple... Nécessairement la série n'est pas absolument convergente et ne suit pas le critère spécial des séries alternées...

On peut prendre les termes:

$$1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2^{1/3}}, -\frac{1}{2} \times \frac{1}{2^{1/3}}, -\frac{1}{2} \times \frac{1}{2^{1/3}}, \frac{1}{3^{1/3}}, -\frac{1}{2} \times \frac{1}{3^{1/3}}, -\frac{1}{2} \times \frac{1}{3^{1/3}}, \dots, \frac{1}{n^{1/3}}, -\frac{1}{2} \times \frac{1}{n^{1/3}}, -\frac{1}{2} \times \frac{1}{n^{1/3}}, \dots$$

La somme vaut 0 mais quand on regarde u_n^3 , on voit

$$1, -\frac{1}{8}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}, -\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{8} \times \frac{1}{3}, -\frac{1}{8} \times \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, -\frac{1}{8} \times \frac{1}{n}, -\frac{1}{8} \times \frac{1}{n}, \dots$$

qui diverge assez clairement (série harmonique).

Tentative infructueuse, si on cherche dans cette direction

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^{1/3}} + \frac{1}{n^{1/3} \ln n} \text{ Non ! car la série diverge...}$$

$$\text{On a } u_n^3 = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{3}{n \ln n} + \frac{3(-1)^n}{n(\ln n)^2} + \frac{1}{n(\ln n)^3} = \text{tout converge sauf } \frac{3}{n \ln n}, \text{ dommage...}$$

Ex 30 MINES 2014 Soit $a \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Montrer que la somme de la série $\sum a^{-n^2}$ est irrationnelle. (On pourra traiter le cas $a = 10$ puis le cas général.)

Sol. 30): Un nombre rationnel a un développement décimal (ou autre) fini ou périodique.