SÉRIES ENTIÈRES ET APPLICATION AUX PROBABILITÉS

Exercices d'application

Ex 1 Calculer le rayon de convergence de $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ lorsque :

- a) $a_n = \frac{(\ln n)^2}{\sqrt{n}}$ b) $a_n = \frac{\operatorname{sh} n}{\operatorname{ch}^2 n}$
 c) $a_{2n} = 2^n$ et $a_{2n+1} = 0$ d) $a_n = \left(\frac{1}{1 + \sqrt{n}}\right)^n$
 e) $a_n = \frac{n^n}{n!}$ f) a_n est la somme des diviseurs premiers de n .

Ex 2

1) Montrer que si la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est de rayon de convergence $R > 0$, alors la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^{2n}$ est de rayon de convergence $\sqrt{R}$.

2) Soient R_1 et R_2 les rayons de convergence respectifs des séries $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{2n} z^n$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{2n+1} z^n$. Montrer que le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ vaut $\min(\sqrt{R_1}, \sqrt{R_2})$, et que, si $|z| < R$, on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{2n} z^{2n} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_{2n+1} z^{2n+1}.$$

Ex 3 Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{e^{x^2} - 1}{x}$ se prolonge sur $\mathbb{R}$ en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Ex 4 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le développement en série entière au voisinage de 0 de $x \mapsto \frac{1}{(1-x)^n}$.

Ex 5 Donner la valeur de $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}$.

Ex 6 Développer en série entière la fonction $x \mapsto \operatorname{ch} x \cos x$.

Ex 7 1) Montrer que pour tout $x \in]-1, 1[$, $\int_0^x \frac{\operatorname{Arctan} t}{t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)^2}$.

2) Montrer que $\int_0^1 \frac{\operatorname{Arctan} t}{t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$.

Ex 8 On veut développer en série entière la fonction $x \mapsto f(x) = \ln \sqrt{x^2 - 2x \cos \alpha + 1}$ où $\alpha \in]0, \pi[$.

1) Justifier et établir que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x - e^{i\alpha}} + \frac{1}{x - e^{-i\alpha}} \right)$.

2) Développer f' en série entière et préciser le rayon de convergence.

3) En déduire le développement de f en série entière.

Ex 9 MINES 2016 RMS

Soit, pour $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$, $a_n = \ln \left(\frac{\sqrt{n} + (-1)^n}{\sqrt{n+1}} \right)$.

1) Nature de la série de terme général a_n ? de la série de terme général $(-1)^n a_n$?

2) Déterminer le rayon de convergence de la série entière de terme général $a_n x^n$.

Exercices d'entraînement

Ex 10 X 2016 RMS

Trouver $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que la suite (u_n) ne converge pas, la série entière $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} u_n x^n$ ait un rayon de convergence égal à 1 et $f(x)$ possède une limite quand $x \rightarrow 1^-$.

Ex 11 Calcul d'un développement en série entière.

Donner le développement en série entière (DSE) au voisinage de 0 ($x \in \mathbb{R}$) des fonctions suivantes en précisant le rayon de convergence de la série entière obtenue :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f(x) = \frac{1}{4+x} & \text{b) } g(x) = \ln(2-x^2) \\ \text{c) } f(x) = \ln(x^2-5x+6) & \text{d) } g(x) = e^{-x} \sin x. \end{array}$$

Ex 12 Recherche de somme

Calculer le rayon de convergence et la somme des séries entières suivantes ($x \in \mathbb{R}$) :

$$\text{a) } \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^{3n}}{n+1} \quad \text{b) } \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^n}{(2n)!} \quad \text{c) } \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^{4n}}{4n+1} \quad \text{d) } \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n! \times (2n+1) \times (2n-1) \times \dots \times 3 \times 1}.$$

INDICATION : on pourra utiliser la décomposition $\frac{1}{1-x^4} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} + \frac{2}{1+x^2} \right]$.

Ex 13 Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. Montrer que le rayon de convergence de la série entière

$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} z^n$ est infini.

Ex 14

- 1) Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ de la fonction f d'une variable réelle définie par $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(n+1)(2n+1)}$
- 2) Calculer la dérivée seconde de $x \mapsto x^2 f(x^2)$ pour x appartenant à l'intérieur de $\mathcal{D}_f$.
- 3) En déduire une expression simple de $f(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}_f$.

Ex 15 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2} dt$.

- 1) Montrer que f est développable en série entière sur $\mathbb{R}$.
- 2) Établir que f est solution de l'équation différentielle $y' + 2xy = 1$.
- 3) Déterminer le développement en série entière de la fonction f .

Ex 16 Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $a_0 > 0$ et $a_{n+1} = \ln(1 + a_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

- 1) Étudier la suite (a_n)
- 2) Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$
- 3) Quelle est la nature de la série pour $x = -R$ et $x = R$ (dans le second cas, on pourra étudier la nature de la série de terme général $\ln\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$) ?

Ex 17 1) Déterminer les solutions développables en séries entières de l'équation différentielle suivante

$$y''(x) - 2xy'(x) - 2y(x) = 0 \quad (\text{E})$$

vérifiant $y'(0) = 0$. Donner une expression pour ces fonctions.

- 2) En déduire la solution générale de l'équation différentielle que l'on exprimera à l'aide de la fonction

$$x \mapsto \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

- 3) En remarquant que pour tout $x > 0$,

$$\int_x^{+\infty} \frac{1}{2t^2} \exp(-t^2) dt \leq \frac{1}{2x^2} \int_x^{+\infty} \exp(-t^2) dt,$$

prouver que $\int_x^{+\infty} \exp(-t^2) dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\exp(-x^2)}{2x}$.

- 4) Déterminer les solutions de l'équation différentielle qui ont une limite finie en $+\infty$.

Ex 18

- 1) Montrer que la série entière

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdots (2n+1)} x^{2n+1}$$

a pour rayon de convergence $\sqrt{2}$.

Pour tout $x \in]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[$, on pose $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdots (2n+1)} x^{2n+1}$.

- 2) Montrer que f est solution de l'équation différentielle

(E) $(x^2 - 2)y' + xy + 2 = 0$.

- 3) Déduire de ce qui précède une expression explicite de f .

Ex 19 X 2016 RMS

Si $n \in \mathbb{N}$, on note f_n le cardinal de l'ensemble

$$\{(a, b, c) \in \mathbb{N}^3, a + 2b + 3c = n\}.$$

Montrer, pour $x \in]-1, 1[$: $\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n x^n$.

Ex 20 ✎

Soit (a_n) une suite de nombres complexes. On suppose que $\sum a_n x^n$ a pour rayon de convergence $R > 0$.

- 1) Déterminer les rayons de convergence de $\sum (a_n \ln n) x^n$ et $\sum \left(a_n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) x^n$.

- 2) Donner un équivalent simple de $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln n x^n$ quand $x \rightarrow 1^-$.

Faire les exercices de la fiche équations différentielles

Exercices d'approfondissement

Ex 21 X 2015 RMS

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2}$.

- 1) Déterminer le rayon de convergence de la série qui définit f .
2) Donner un équivalent de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 1^-$.

Ex 22 ✎ X 2019 RMS

- 1) Soit f la fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$. Est-elle développable en série entière autour de 0 ?
2) Soit $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que g est développable en série entière dans un voisinage de 0 si et seulement s'il existe $M > 0$, $a > 0$ et $\eta > 0$ tels que, pour tout $x \in]-\eta, \eta[$, on ait $|g^{(n)}(x)| \leq M \cdot a^n \cdot n!$.

3) (je ne sais pas faire) On revient à la fonction f de la question 1).

Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sup_{|x| \leq \eta} |f^{(n)}(x)| \geq (n!)^{\frac{3}{2}}$.

Ex 23 🐞 X 2017 RMS

Soit $r \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note a_n le nombre de mots de n lettres sur l'alphabet $\{0, 1\}$ ne contenant pas r zéros consécutifs. On pose $a_0 = 1$. Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

- 1) Montrer que le rayon de convergence de f est > 0 .
- 2) Trouver une relation de récurrence entre les a_n .
- 3) Exprimer $f(x)$.

Ex 24 🐞 ENS 2017 RMS

Soient $f : z \mapsto \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{z^k}{k}$ et $\Omega = \{re^{i\theta} ; 0 \leq r \leq 1, -\pi + \varepsilon \leq \theta \leq \pi - \varepsilon\}$.

- 1) Déterminer le rayon de convergence de la série entière qui définit f .
- 2) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n : z \mapsto \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{z^k}{k}$. Montrer que (S_n) converge uniformément vers f sur Ω .

INDICATION. Majorer $T_n(z) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} z^k$ sur Ω et écrire

$$S_n(z) = \sum_{k=1}^n \frac{T_{k-1}(z) - T_k(z)}{k}.$$

- 3) On fixe $\theta \in]-\pi, \pi[$. Soit $\ell : x \in [0, 1[\mapsto f(xe^{i\theta})$. Calculer ℓ' .
- 4) Montrer que $x \mapsto e^{\ell(x)}$ a une dérivée seconde nulle.
- 5) En déduire la valeur de $f(e^{i\theta})$ pour $\theta \in]-\pi, \pi[$.

Probabilités révision

Ex 25 Soient X et Y deux v.a.d. indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ de lois respectives de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ et $\mathcal{P}(\mu)$. Déterminer la fonction génératrice de $X + Y$. En déduire la loi de $X + Y$.

Ex 26 On considère une variable aléatoire $N : \Omega \rightarrow \mathbb{N}^*$ et une famille de variables aléatoires $X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$, on suppose que les variables N et $(X_n)_{n \geq 1}$ sont indépendantes et que les variables aléatoires X_n ont même loi.

Pour $t \in [-1, 1]$, on note $G_N(t) = \mathbb{E}(t^N) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n) t^n$ et $G_{X_i}(t) = \mathbb{E}(t^{X_i})$ les fonctions génératrices associées.

- 1) On définit la variable aléatoire discrète $S = \sum_{n=1}^N X_n$. Déterminer la fonction génératrice $G_S(t) = \mathbb{E}(t^S)$ en fonction de G_N et G_{X_i} sur $] -1, 1[$.
(on s'autorisera sans justifier en filière PC l'interversion des signes somme).
- 2) **Application** On lance un dé de 6, on note le nombre obtenu sauf si on obtient un 6 auquel cas on relance le dé, on note alors la somme des deux nombres obtenus sauf si on a encore obtenu un 6 auquel cas on relance le dé etc. Une fois cette somme N notée (par exemple on a obtenu les lancers 6, 6 et 4 donc $N = 16$), on lance N fois le dé et on inscrit le score obtenu S . Quelle est l'espérance de S c'est-à-dire le score en moyenne ?

Ex 27 🐞

Marche aléatoire équilibrée, retour à l'origine

On pose $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ avec (X_n) v.a.i.i.d. de Rademacher.

On note pour $n \geq 1$, $p_n = \mathbb{P}(S_n = 0)$ et $f(n) = \mathbb{P}(S_n = 0, S_1 \neq 0, \dots, S_{n-1} \neq 0)$ probabilité de premier retour en 0. On conviendra que $S_0 = 0$ et donc que $p_0 = 1$. En revanche on prendra $f(0) = 0$.

- 1) Montrer que pour $n = 2k$, $p_n = \binom{2k}{k} \frac{1}{4^k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\pi k}}$.
- 2) Calculer $f(1)$, $f(2)$.

3) On pose $S(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n t^n$ et $F(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} f(n) t^n$ (séries entières de rayon ≥ 1).

Vérifier que pour $|t| < 1$, $S(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$.

4) On note A_k « le premier retour en 0 se fait à l'étape k ».

Montrer que pour $n \geq 1$, $\mathbb{P}(S_n = 0) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(S_n = 0 \mid A_k) \mathbb{P}(A_k)$.

Que vaut $\mathbb{P}(S_n = 0 \mid A_k)$? (c'est le point-clé de l'exercice).

5) Montrer que pour $n \geq 1$, $p_n = \sum_{k=1}^n p_{n-k} f(k)$.

En déduire que pour $|t| < 1$, $S(t) = 1 + S(t)F(t)$.

6) En déduire que $F(t) = 1 - \sqrt{1-t^2}$. Calculer $f(n)$.

7) Montrer que presque sûrement, on a un retour à l'origine.

Ex 28

Jeu de dés, Galton-Watson - Python

On considère une variable aléatoire $N : \Omega \rightarrow \mathbf{N}^*$ et une famille de variables aléatoires $X_n : \Omega \rightarrow \mathbf{N}$, on suppose que les variables N et $(X_n)_{n \geq 1}$ sont indépendantes et que les variables aléatoires X_n ont même loi.

Pour $t \in [-1, 1]$, on note $G_N(t) = \mathbb{E}(t^N) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n) t^n$ et $G_{X_i}(t) = \mathbb{E}(t^{X_i})$ les fonctions génératrices associées.

1) On définit la fonction $S = \sum_{n=1}^N X_n$. Montrer que la fonction S est une variable aléatoire discrète et déterminer la fonction

génératrice $G_S(t) = \mathbb{E}(t^S)$ en fonction de G_N et G_{X_i} sur $] -1, 1[$.

(on admettra que l'on peut échanger les sommes doubles dans cette question).

2) On suppose que les variables aléatoires X_1 et N possèdent une espérance. Montrer que S possède une espérance et la calculer.

3) **Application I.** On lance un dé de 6, on note le nombre obtenu sauf si on obtient un 6 auquel cas on relance le dé, on note alors la somme des deux nombres obtenus sauf si on a encore obtenu un 6 auquel cas on relance le dé etc. Une fois cette somme N notée (par exemple on a obtenu les lancers 6, 6 et 4 donc $N = 16$), on lance N fois le dé et on inscrit le score obtenu S . Quelle est l'espérance de S c'est-à-dire le score en moyenne? Vérifier votre calcul par un test statistique écrit en Python.

4) **Prolongement et application II, processus de Galton-Watson**

On étudie à la descendance d'un individu au cours des générations dans une société patriarcale¹. On suppose que le nombre de descendants masculins d'un individu suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda \in]0, +\infty[$. On note S_0 le nombre d'individus masculins au début de l'étude, S_n le nombre de descendants à la n^e génération. On suppose que $S_0 = 1$.

a) Écrire une fonction en Python renvoyant le nombre de descendants masculins à la n^e génération puis donner une valeur expérimentale de $\mathbb{E}(S_n)$ et de la variance $V(S_n)$ pour $\lambda = 2, 2$ et $n = 8$.

INDICATION on pourra utiliser la fonction `poisson(lam)` du sous-module `numpy.random`.

b) On modélise de la façon suivante : on se donne une famille de variables aléatoires indépendantes $(X_{i,j})_{(i,j) \in \mathbf{N} \times \mathbf{N}^*}$,

de même loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ et on pose $S_0 = 1$ et pour $n \geq 1$, $S_n = \sum_{j=1}^{S_{n-1}} X_{n-1,j}$.

Déterminer la fonction génératrice G_{S_n} de la variable aléatoire S_n .

c) Quelle est la valeur théorique de $\mathbb{E}(S_n)$?

d) Même question pour la variance de S_n .

Ex 29 MINES 2018 RMS

Soit $g : t \mapsto \frac{e^t}{1+e-t}$.

1) Montrer qu'il existe une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbf{N}$ dont la fonction génératrice G_X est égale à g .

2) Soient $n \geq 2$, $(X_{i,j})_{1 \leq i < j \leq n}$ des variables aléatoires i.i.d. suivant la loi de X . Déterminer la probabilité que la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & X_{1,2} & \cdots & X_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & X_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$
 admette un nombre fini de sous-espaces stables.

1. Ce modèle date du XIX^e siècle...